

Entomologische Nachrichten.

Begründet von Dr. F. Katter in Putbus,
herausgegeben von Dr. F. Karsch in Berlin.

Die Entomologischen Nachrichten erscheinen regelmässig am 1. und 15. jeden Monats. Der Preis des Jahrganges beträgt 6 Mark, oder, bei directer Franco-Versendung unter Kreuzband durch die Post für Deutschland und Oesterreich-Ungarn M. 7, für das Ausland (Weltpostverein) M. 7,50 (7 sh. 6 d., 9 frs. 50 cent.). Auch nehmen alle in- und ausländischen Buchhandlungen und die Postanstalten (Zeitungs-Preisliste Nr. 2346) Bestellungen entgegen.

Anzeigen für die durchlaufende Zeile 30 Pf. Beilagen bis zur Stärke von $\frac{1}{4}$ Bogen (4 Oktav-Seiten) 6 Mark; stärkere Beilagen unterliegen besonderer Vereinbarung.

Zuschriften, die Redaction betreffend, werden an Dr. F. Karsch in Berlin N.W., Birkenstr. 75, oder durch die Verlagshandlung erbeten; sonstige geschäftliche Mittheilungen sowie alles, was die Expedition betrifft, sind an die Verlagsbuchhandlung von R. Friedländer & Sohn in Berlin, N.W., Carlstr. 11 zu richten.

Inhalt von Nr. XIV.

Friese, H., Die Bienengattung <i>Exoneura</i> Sm.	209
Ducke, A., Neue Arten und Varietäten der Gattung <i>Osmia</i> Panz.	211
Reitter, E., Ueber einige Coleopteren aus der palaearktischen Fauna und aus Japan	216
Ohaus, F., <i>Popillia complanata</i> Newmann und ihre Varietäten	220
Schulz, H., Neue Varietäten von <i>Hippodamia septemmaculata</i> Deg.	223
Litteratur	224

Berlin

R. Friedländer & Sohn.

N.W., Carlstr. 11.

Fauna Regni Hungariae.

Animalium Hungariae hucusque cognitorum enumeratio systematica.
In Memoriam Regni Hungariae Mille adhinc Annis constituti edidit
Regia Societas Scientiarum Naturalium Hungarica.

Coleoptera

auctore

D. Kuthy.

213 pag. in-4. cum mappa colorata. — Preis 12 Mark.

Lepidoptera

auctoribus

L. Abafi-Aigner, J. Pavel et F. Uhryk.

82 pag. in-4. cum mappa colorata. — Preis 5 Mark.

Hymenoptera

auctore

A. Moscary.

113 pag. in-4. cum mappa colorata. — Preis 8 Mark.

Diptera

auctore

J. Thalhammer.

76 pag. in-4. cum mappa colorata. — Preis 4 Mark.

Hemiptera

auctore

V. Horváth.

100 pag. in-4. cum mappa colorata. — Preis 4 Mark.

Die übrigen Abtheilungen werden nicht in den Handel gebracht. Die
„Fauna“ wird erst in einigen Jahren veröffentlicht werden.

Von uns ist zu beziehen:

On the Instincts and Habits of the Solitary Wasps

by

G. W. and Elizabeth G. Peckham.

Madison Wis. 1898. Imp.-8.

4 and 245 pg. with 14 plates (2 coloured). — Preis 12 Mark.

In unserem Verlage erschien:

J. C. F. Klug's

Gesammelte Aufsätze über die Blattwespen,

in einem Bande herausgegeben von Dr. J. Kriechbaumer. 1884.

Ein Band von 300 Seiten in-4. mit einer colorirten Doppeltafel.

Preis 16 Mark.

Kürzlich erschien und ist von uns zu beziehen:

F. F. Kohl

Die Gattungen der Sphegiden.

Mit 7 Tafeln und 90 Abbildungen im Text. Hoch-4.

Preis 15 Mark (anstatt des Ladenpreises von M. 23,40).

Auch die übrigen hymenopterologischen Arbeiten Kohl's sind vorrätzig.

Entomologische Nachrichten.

Begründet von Dr. F. Katter in Putbus.

Herausgegeben

von Dr. Ferd. Karsch in Berlin.

XXV. Jahrg.

Juli 1899.

No. 14.

Die Bienengattung *Exoneura* Sm.

Von H. Friese, Innsbruck.

Smith begründete 1854 in seinem grundlegenden Werk „Catalogue of Hymenopterous Insects in the collection of the British Museum“ die Bienengattung *Exoneura* aus Australien und gab auf Taf. 7 Fig. 4 und Taf. 9 Fig. 9—13 die charakteristischen Bildungen durch Zeichnungen wieder.

Die *Ceratina*-ähnliche Biene ist leicht an den zwei Cubitalzellen und dem einen Nervus recurrens von den verwandten *Ceratina* und *Allodape* zu trennen, auch ist die eigenthümliche Abplattung des 5. und 6. Dorsalsegmentes für diese Gattung im ♀ eigenthümlich.

Die einzige Art *bicolor* war bisher nur im ♀ Geschlechte vom Swan River, von Van Diemens Land und Sydney bekannt geworden; ich kann durch die Freundlichkeit von Prof. W. Froggatt heute das ♂ von *bicolor* und 2 weitere Arten, die eine aus dem palaearktischen Gebiet (Libanon), bekannt geben.

1. *Exoneura bicolor* Sm. ♂.

♂ wie das ♀, aber Kopf und Thorax lang schwarz behaart, Gesicht schmal nur von Augenbreite, Augen sehr gross und hervortretend, Clypeus mitten in grösserer Ausdehnung weiss und auch auf der weissgefärbten Fläche deutlich schwarz behaart; Mesonotum fast glatt, aber nicht so glänzend als beim ♀; obere Zone des Mittelsegmentes ebenso horizontal liegend als beim ♀. Abdomen mit 7 sichtbaren Dorsal- und 6 Ventralsegmenten, die mit einzelnen langen und schwarzen Haaren besetzt sind, Segment 1—2 fast ganz schwarz, 3. oben nur auf der Scheibe, 4.—5. mit einigen verwaschenen, dunklen Flecken auf dem rothen Untergrunde; Ventralsegmente einfach gewölbt, vorherrschend roth. Beine einfach, alle Schenkel bis auf die Spitze schwarz. — 6 mm lg. — $1\frac{3}{4}$ mm lat.